

BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Kedves betegünk!

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önt felvilágosítani a légutak tervezett tükrözéséről, a bronchoscopiáról. Panaszai és az eddigi leletei alapján indokoltnak tartjuk a vizsgálatot, melynek során a vizsgáló orvos egy műszer segítségével betekinthez a légcsőbe és annak folytatásaként a hörgőfa fő ágazásaiba.

A vizsgálat leírása: A vizsgálatot fekvő testhelyzetben végezzük, éhgyomorral. A vizsgálat alatt biztonsági okokból az Ön szemét kendővel fedjük le. A műszer (bronchoscop) levezetését helyi érzéstelenítés előzi meg. Ilyenkor Lidocain spray-t fújunk a garatképletekre, majd fecskendezünk be a hangszalagokra. Az érzéstelenítés kellemetlen, de szükséges a vizsgálat további problémamentes kivitelezéséhez. Ezt követően az eszközt egy csutorán keresztül szájon át vezetjük a légcsőbe, majd a kisebb hörgőágakba. A kezelőorvos a levezetett eszköz segítségével nyert képet monitoron nézi.

Bizonyos beavatkozások előtt, a pontos munkavégzés, illetve a vizsgálati idő megnyúlása miatt a vizsgálat elején bódító injecció adására is van lehetőség.

A bronchoscop munkacsatornáján keresztül levezetett kicsiny eszközökkel fájdalommentesen mintákat vehetünk és lehetőségünk van a kórosan felgyülemlett váladék eltávolítására is. A mintavételt követően bakteriológiai, szövettani, sejttani vizsgálatok történnek a betegség pontos megállapítása céljából.

A vizsgálat kellemetlen, végrehajtása során a vizsgálatot végző orvos és a jelenlevő asszisztensek folyamatosan segítenek Önnek a minél gyorsabb és problémamentesebb lefolyásban. Az elhangzott tanácsok minden esetben az Ön érdekét szolgálják, kérjük tartsa be őket. A beavatkozás során az ujjára helyezett műszer segítségével tájékozódunk a vér oxigén telítettségéről, szükség esetén oxigént is adunk Önnek.

A vizsgálatot végző orvos a tájékoztató beszélgetés során részletesen elmagyarázza az Ön esetében várható, tervezett beavatkozásokat.

A vizsgálat végeztével a vizsgáló orvos minden esetben leletet készít a vizsgálat eredményéről.

A vizsgálat a különböző diagnosztikus illetve terápiás beavatkozásoktól függően 5-25 percig tart, a Pentax modern SAFE 3000 videoendoscopos technikájával történik.

Kérjük ügyeljen a következőkre:

- 24 órával a vizsgálat előtt **NE DOHÁNYOZZON!**
- 4 órával a vizsgálat előtt **NE EGYEN!**
- 2 órával a vizsgálat előtt **NE IGYON!**
- Gyógyszerei bevételét beszélje meg kezelőorvosával!

Lehetséges szövődmények: teljes kockázatmentesség semmilyen orvosi beavatkozás esetén sem garantálható. A bronchoscopia során viszonylag ritkán fordulnak elő súlyos szövődmények, nemzetközi felmérések szerint ezek gyakorisága 1-3 százalékre (ez nálunk azt jelenti, hogy kb. 100 évente 1). A korábbi betegségeinek ismerete, a hörgőtükrözést megelőzően végzett vizsgálatok csökkentik a szövődmények előfordulásának lehetőségét. A nagyobb, nehezen uralható sebési beavatkozást igénylő vérzések, a gége, a légcső és a hörgők sérülései ritkák.

A kockázat további csökkentése céljából kérjük, aláhúzással, vagy bekarikázással válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1. Tud-e Önnél erősebb vérzékenységi hajlamról kisebb sérüléseknél, vagy foghúzás során? Könnyen keletkeznek e kék foltok a testén?
Igen Nem
2. Tud-e Ön asztmás megbetegedéséről, van-e valamilyen allergiája, túlérzékenysége ételre, gyógyszerre, ragtapaszra, helyi érzéstelenítőre (Lidocain)?
Igen Nem
3. Van-e magas vérnyomása, szívritmuszavara, beültetett szívritmus-szabályzója (pacemaker)?
Igen Nem
4. Van-e Önnek meglazult foga, kivethető protézise? (Ha igen, kérjük a vizsgálat előtt távolítsa el, és a vizsgálatot követően legalább 2 óráig ne tegye vissza!)
Igen Nem
5. Ismert máj-, vesebetegsége van-e? Szed-e véralvadást befolyásoló gyógyszert (Aspirin, Astrix, Colfarit, Plavix, Ipaton, Aplatic, Ticlid, Syncumar)
Igen Nem
6. Egyéb fontos közlendői:
.....
.....

A vizsgálat utáni utasítások: A torok és garat érzéstelenítés utáni állapota miatt kérjük, hogy a vizsgálat után 2 óráig ne egyen és ne igyon semmit (a száj kiöblítése is ellenjavalt!)! Rövid ideig redkedtséget tapasztalhat, köpetében a vizsgálatot követő két napig vényomokat észlelhet, hőemelkedés, láz előfordulhat. Amennyiben a vizsgálat során beadott gyógyszerek az Ön reakciókészségét befolyásolják, a vizsgáló orvos ezzel kapcsolatban tájékoztatást ad. Kérjük, hogy a bronchológiai rendelőt csak az orvossal történt megbeszélést követően hagyja el. A vizsgálat után 24 óráig nem vezethet járművet és nem kezelhet gépet, hacsak az orvos erre vonatkozóan más utasítást nem ad.

A BETEG NYILATKOZATA A FELVILÁGOSÍTÓ BESZÉLGETÉS UTÁN:

Dr. ezen tájékoztatóban leírtak alapján felvilágosító beszélgetést folytatott velem, melynek során minden engem érdeklő kérdést feltehettem, és arra megfelelő választ kaptam. Nincs több kérdésem.

A javasolt vizsgálatba, illetve az esetlegesen szükségessé váló kiegészítő beavatkozások elvégzésébe

BELEEGYZEM

NEM EGYEZEM BELE

(annak ellenére, hogy az elutasítás esetleges, egészségre káros következményeiről felvilágosítást kaptam)

Farkasgyepű, 200

.....
beteg aláírása

.....
orvos aláírása